



ตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บถูกต้อง^{ด้วยกันเมษายน}

1 นมถุงและนมกล่อง ต้องตรวจสอบอย่างไรให้
ช้อปแห้ง

นมนาล่าเรอโรส (นมถุง) ตรวจดูคุณภาพมีน้ำ ต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียล

ข้อสังเกต

- ตรวจสอบฉลากว่าถูกต้อง ครบถ้วน เลขสารบบอาหาร
- ตรวจสอบกล่องนมว่ามีรอยร้าวรั่ว หักย่น บวม หรือไม่ รักษาความบริโภคก่อน
- ตรวจสอบลักษณะของนมว่า มีสี กลิ่น รส ผิดปกติหรือไม่
- นมยังไม่หมดอายุ/ใกล้หมดอายุ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่ฉีกขาด ไม่ร้าว ไม่รั่ว ไม่รีบม

ข้อควรระวัง

- หากพบกล่องนมที่บวม มีรอยปรี หรือเปียกซึ่น ให้แยกกล่องนมนั้นออกจากที่ และบรรจุ入ถุงเพื่อดินหรือเปลี่ยนกับผู้ผลิต
- ให้เด็กที่มีนมให้หมดถุงหรือกล่องในคราวเดียว ไม่ควรเก็บไว้ต่อภายหลัง

จัดเก็บก่อนแจก-นมกล่อง (นม ยู เอช ที)

นมกล่อง-กล่องต้องลวกดี กลิ่น รส สีของนม ไม่เปลี่ยนไป

ข้อแนะนำ

น้ำควรเย็น ยู เอช ที ในกระติก้าเย็น หรือเย็นที่มีหัวชี้ เพราะหัวอาจทำให้กระถางของกล่องนมเมื่อยุบ

ไม่ใช้มีด หรือของมีคม ก็รีบกันกล่องนมร้าวซึ่น



จัดเก็บก่อนแจกนมถุง (นมนาล่าเรอโรส)

นมถุงแห้งเสียร้าย ก่อนแจกจ่าย ต้องไม่รีบม

การเก็บรักษานมโดยเรียน ต้องให้มีเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพในวันที่รีบม (ภายใน 9 ชั่วโมง)

ข้อแนะนำ

ต้องเก็บไว้ในถุงเย็น ที่มีความเย็นพอ หรือในถุงเย็นที่มีหัวชี้ ที่จะสามารถนำไปยังผู้ผลิต

นมถุงมีผลิตภัณฑ์ที่มีหัวชี้ ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียล

โรงเรียนปลอดภัย^{เด็กไทยแข็งแรง}

สังเกตถอนตัว กลิ่น สี รส ไม่เปลี่ยน
น้ำดื่มเติมใหม่แข็งแรง

วิธีง่าย ๆ ในการตรวจสอบว่านมเสียหรือไม่ ทำได้ ดังนี้

1) สังเกตภาชนะบรรจุ ลักษณะพิเศษที่ห้าม สภาพภาชนะบรรจุลักษณะ ไม่มีรอยเยือน นมดี ต้องไม่ผิดร้ายรึม



2) หากนมเป็นก้อนและมีการแยกชั้น ถ้านมมีลักษณะแบบนี้ ให้ออมน้ำไว้ก่อนแล้วว่า นมเสียแล้ว ได้แก่



3) ดูและชิม ถ้ามีร่องรอยคลื่นที่ผิดปกติ ให้นำเข้าใจไว้ก่อนว่านมเสียแล้ว เช่น



เด็ก ๆ ตื่นนมโรงเรียนปลอดภัย

โปรดตื่นและแดดรีบม
ทำให้เด็กแข็งแรง เจริญเติบโต

สำเนาหนังสือแจ้งเหตุ

โรงงาน และ โรงเรียน ใส่ใจ นมโรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี

ข้อควรระวัง

กระบวนการผลิตมีความบกพร่อง ได้แก่

- ใช้วัสดุร้อนไม่ถูกเชิงยิง หรือใช้เวลาในการวางรีบมใน
- การเก็บรักษาแหล่งร้าย เช่น ไม่เปิดฝาถังเก็บนมรอบบรรจุ
- การบรรจุไม่ถูกต้องถูกย้อม ทำให้ฝาสีขาวร้าวรุ่ง หรือใช้ภาชนะบรรจุที่ไม่สะอาด
- เก็บรักษาเพื่อรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะนมนาล่าเรอโรสต้องเก็บที่ อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียล ล่วงไป ยู เอช ที่ ก็ต้องไม่รีบมในที่ร้อน หรือโอนแยก การจัดเก็บที่โรงเรียนไม่ถูกต้อง เช่น
- แม่รวมกับอาหารสัตว์
- นำหัวแข็งออกจากถัง ทำให้อุณหภูมิไม่ถูกยิงต่อการจัดเก็บนม
- นมหมดอายุ ลังเก็บได้จากวันที่ควรรีบมก่อนที่จะบุบหลอกและก่อจุก
- นมดูดนม ลังเก็บได้จากวันที่ควรรีบมก่อนที่จะบุบหลอกและก่อจุก

การดูแลเด็ก ๆ เมื่อมีอาการอาหารเป็นพิษ

การปฐมพยาบาล

- ควรให้กินยาแก้อาเจียน
- ทำความสะอาดหัวเข็มที่ใช้แล้วและเก็บให้เรียบร้อย
- สังเกตเด็กที่มีอาการชาดหัวเข็มที่ใช้แล้ว อาการของกราดหัวเข็ม ได้แก่ ปากแห้ง กระบอกตาลีก กระแทมมอมน้ำ วิจารณ์เด่นเรื่งและปัสสาวะน้อยลง ถ้าเด็กมีอาการชาหัวเข็ม ควรรีบมาในแพทช์
- ถ้าเด็กไม่มีอาการชาหัวเข็ม อาจถูกและเก็บแล้วต่อไป และพยาบาลให้ทั้งเด็กที่มีนมที่ลิบหน่อย ๆ , แต่น้อย , เพื่อไม่ให้อาเจียน
- ควรให้กินอาหารอ่อนๆ , เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ซึ่งดีกว่าอาหารแข็ง ๆ ที่อยู่ยาก